

Die
Monarthritis rheumatica
und ihre
Behandlung aut der I. medizinischen Abtheilung.

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doctorwürde
in der

Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des

Herrn Geheimraths Professors

D^R. RITTER VON GIETL


der medizinischen Fakultät zu München

vorgelegt

von

Ludw. Phil. Steinhuber

approb. Arzte.



München, 1881.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Die
Monarthritis rheumatica
und ihre
Behandlung aut der I. medizinischen Abtheilung.

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doctorwürde
in der
Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe
unter dem Präsidium
des
Herrn Geheimraths Professors
D^R. RITTER VON GIETL
der medizinischen Fakultät zu München
vorgelegt
von
Ludw. Phil. Steinhuber
approb. Ärzte.

München, 1881.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

Meinem hochverehrten Lehrer

Herrn

Geheimrath Professor Dr^o Ritter v. Giell

Leibarzt Seiner Majestät des Königs von Bayern

in Dankbarkeit und Hochachtung

gewidmet.

Der Verfasser.

Aetiologie, Symptomatologie und Pathologie.

So groß die Ausbeute der gesammten medizinischen Literatur an Abhandlungen über den Rheumatismus articulorum acutus im Allgemeinen ist, so wenig bietet sie uns hinsichtlich dessen monoarticulären Form, der Monarthrititis rheumatica. Der Grund, warum diese Krankheitsform von einer Anzahl Autoren in Monographien, sowie in diesbezüglichen Abschnitten vieler Lehrbücher und größerer Werke stillschweigend übergangen oder nur nebenfächlich erwähnt wurde, mag wohl darin liegen, daß sie vielleicht von jeher in einem mehr oder weniger intensiven Krankheitsverlauf als solche dem Beobachter entging, entweder weil ein im Gefolge einer lokalisirten Gelenk-Affektion sich findender consensueller Schmerz eines benachbarten Gelenkes, fortgepflanzt durch dem afficirten Gelenke nahe liegende Nervenäste eine Multiplicität vortäuschte, oder weil eine solche anerkannt wurde, indem bei einer bereits bestehenden Lokalisation intercurrent das eine oder das andere Gelenk befallen wurde, wie dies ja nicht selten vorkommt, oder schließlich weil der Monarthrititis rheumatica einfach der Charakter einer rheumatischen Gelenk-Entzündung abgeprochen und ihr eine traumatische oder dyskrasische Basis zuerkannt wurde.

Diefer letzteren Ansicht huldigt Trousseau: ¹⁾ „la mala-

¹⁾ A. Trousseau, clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris.

die (rhumatisme articulaire aigu) peut rester longtemps fixé; cette complication ne s'observe guère chez les scrofuleux ou les tuberculeux.“ Lévèque ¹⁾ spricht sich ebenfalls dahin aus, daß die Aetiologie der Monarthrits meist auf Kachexie beruhe, besonders in Folge von Skrofulose und Tuberkulose.

Lebert ²⁾ gibt zu, daß es eine Polyarthrits, sowie eine Monarthrits gibt, die scrofulösen, syphilitischen, überhaupt dyskrasischen Ursprungs sein kann, gerade deshalb will er das alte gebräuchliche Wort „Rheuma“ erhalten wissen, an Stelle eines unbekannten Elementes, welches dem ihm eigenthümlichen Charakter gemäß eine akute Gelenkentzündung bewirkt, mit Ausschluss jedweder dyskrasischen Grundlage.

Was die Diagnose der Monarthrits rheumatica betrifft, so sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- 1) Eine hereditäre Disposition zum Gelenkrheumatismus.
- 2) Eine acquirirte Disposition durch einmal oder öfters überstandene derartige Erkrankung.
- 3) Eine unmittelbar vorhergehende Polyarthrits.
- 4) Vorhandensein von Complicationen seitens des Endocardiums, des Pericardiums, der Pleura etc.
- 5) Fehlen einer Contusion, eines Falles, mit einem Worte eines traumatischen Einflusses, konstatiert durch die Anamnese.
- 6) Ausschluss einer dyskrasischen Arthrits durch ganz fehlende Tendenz zur Abscessbildung, durch das Alter etc.

In Bezug auf die Häufigkeit des Vorkommens der monoartikulären Form mögen hier einige Zahlen-Angaben Platz finden; Lebert theilt unter 122 Fällen von Rheumatismus articularis acutus 24 Beobachtungen von Monarthrits rheumatica mit (19,6⁰/₀); Roth ³⁾ unter 79 Fällen 5 Beobachtungen (6,3⁰/₀).

¹⁾ Lévèque, sur le rhumatisme monoarticulaire aigu, thèse. Paris.

²⁾ Lebert, Klinik des akuten Gelenkrheumatismus.

³⁾ Beitrag zur Statistik des ak. Gelenkrheumatismus. Würzburg med. Zeitschrift, Band IV.

Nach Tüngel¹⁾ waren unter 126 Fällen von akutem Gelenkrheumatismus, die im Jahre 1858 zur Behandlung kamen, 16 auf ein Gelenk beschränkt (12,6%); unter 76 Fällen, die im Jahre 1859 behandelt wurden, waren 9 monoartikulär (11,8%).

Nach dem Sanitätsbericht²⁾ des Garnisonslazarethes Baden b. W. kamen im Jahre 1872 70 Fälle von akutem Gelenkrheumatismus zur Kur, von denen 26 Fälle auf ein Gelenk lokalisiert waren, (37,1%). — Der mittlere Prozentsatz dieser fünf Angaben beläuft sich auf 17,5%. Außerdem theilt noch Lévègue 10 Fälle von Monarthrit mit, Riefs³⁾ 2 Fälle.

Bezüglich der relativen Häufigkeit des Befallenseins der einzelnen Gelenke dürfen wir das Knie- und Handgelenk als besonders bevorzugt ansehen; so war unter den 24 in Leberts Klinik gesammelten Beobachtungen der Prozess 9 mal auf das Handgelenk fixiert, und zwar 7 mal rechts, 2 mal links, 5 mal auf das Kniegelenk und zwar sämmtlich auf das rechte Knie, 4 mal auf das rechte Fußgelenk, 4 mal auf ein Nackengelenk, 1 mal auf den rechten Ellenbogen, 1 mal auf die rechte Schulter.

Unter Tüngel's 16 Fällen war das Kniegelenk 7 mal, das Fußgelenk 3 mal, das rechte Metatarsalgelenk 2 mal, das Unterkiefer-, rechte Hand-, Hüft- und das rechte Metacarpalgelenk je 1 mal befallen.

Von den 10 Beobachtungen, die Lévègue macht, betraf die Localisation 6 mal das rechte Kniegelenk, 3 mal das Hüft- und 1 mal das rechte Ellenbogengelenk.

Auffallend macht sich hier eine weit größere Disposition der rechten als der linken Körperhälfte zur lokalen Affektion geltend; ein urfächliches Moment hiefür ist wohl kaum erwiesen; vielleicht dürfte jenes zur Geltung kommen, welches

¹⁾ Tüngel C., klin. Mittheilungen von d. med. Abthlg. des allgemeinen Krankenhauses in Hamburg, 1858, 1859.

²⁾ Jahresbericht der gesammten Medizin 1872 II.

³⁾ Realencyclopädie der gesammten Medizin.

Chambers¹⁾ für das Zustandekommen der Monarthrits rheumatica überhaupt aufrecht hält, daß nämlich Leute aus der arbeitenden Volksklasse, bei welchen sich schon seit längerer Zeit wandelbare Gelenkschmerzen bemerkbar machen, derselben nicht achtend ihren Geschäften nachgehen, dabei die leidenden Gelenke bewegen, vornehmlich jene der rechten Körperhälfte, die ja bei der Arbeit ganz besonders in Betracht kommen, wodurch sich zu rheumatischen Affektion eine heftige Entzündung gefellt, Geschwulst und Schmerzen fix werden.

Hinsichtlich der Geschlechts- und Altersverhältnisse ist für's Erste vorwiegend das weibliche Geschlecht betroffen; für's Zweite fällt die Mehrzahl der an monoartikulären Rheumatismus Erkrankten in den Zeitraum vom 20. bis 35. Lebensjahre.

Im Beginn der Erkrankung ist ein multipler Charakter des Rheumatismus articularis vorherrschend; ehe es zur Lokalisation kommt, mögen immerhin 8—14 Tage vorübergehen; ist dieselbe zu Stande gekommen, so können in vielen Fällen hinwiederum transitorische Paroxysmen von Polyarthrits sich einstellen, welche Thatfachen als wichtige diagnostische Punkte für die Annahme einer rheumatischen Monarthrits in den schließlicb beigefügten Krankengeschichten ihre volle Befätigung finden; gegen Annahme einer traumatischen Ursache schützen hiebei die anamnestisch auf das sorgfältigste gepflogenen Recherchen. In Bezug auf die Dauer fehlt nicht viel, wenn bei der Monarthrits die Doppelte der Polyarthrits in Anschlag kommt.

Jaccoud²⁾ charakterisirt die Monarthrits auf folgende Weise:

„Lorsque le rhumatisme, au lieu d'être polyarticulaire, reste fixé sur une seule jointure (rhumat. fixe ou monoarticulaire) les lésions anatomiques sont les mêmes, mais à durée égale elles sont toujours plus avancées que dans la polyarthrite,

¹⁾ Th. Chambers treatment of acut rheumatisme, Lancet Aug. 1823.

²⁾ S. Jaccoud traité de Pathologie interne.

surtout en ce qui concerne les cartilages et les os. Le rhumatisme fixe (monarthrite rhumatismal) est caractérisé par les signes physiques de l'hydarthrose et de l'arthrite et sa nature rhumatismale ne peut être affirmée que lorsqu'il survient comme reliquat d'une polyarthrite aiguë, ou bien lorsqu'il s'établit chez un individu qui a déjà éprouvé les manifestations ordinaires du rhumatisme articulaire ou musculaire.

Der Schmerz ist dumpf, nicht immer gleich heftig, sondern tritt in Intervallen stärker hervor, ist namentlich bei Bewegung unerträglich; derselbe weicht zuerst einem entsprechenden therapeutischen Verfahren, während die Geschwulst, bedingt durch seröse Infiltration der umgebenden Weichtheile, sowie durch einen serösen Erguss in das Gelenk selbst, hartnäckig besteht; Substanzverluste am Knorpel geben sich bei Bewegung der Gelenkenden aufeinander mit deutlicher Crepitation zu erkennen.

Heilung kommt in der Mehrzahl der Fälle bei geeigneter Behandlung vollkommen zu Stande, wenn sich auch noch für längere Zeit geringgradige Gelenksteifigkeit oder sonstige Bewegungsstörungen geltend machen. Eine richtige Funktionsfähigkeit sehr in Frage stellende Formveränderungen sind die schon früher von Lebert beobachteten Subluxationen, beruhend auf partieller Destruktion des Bandapparates; zwei diesbezügliche Fälle kamen bereits in diesem Jahre auf der Klinik des Herrn Geheimrath v. Gietl zur Beobachtung (vide Krankengeschichte I. und III.); beide Fälle betrafen das Handgelenk, welches Gelenk auch nach Lebert in dieser Beziehung große Disposition zeigt.

Wirkliche Gelenkvereiterungen ¹⁾ gehören jedoch zu den Seltenheiten; gleichwohl ist eine Tendenz hiezu nicht ausgeschlossen. Nur lange Dauer der Erkrankung in Folge therapeutischer Mißgriffe kann Veranlassung dazu geben; mehr zu

¹⁾ Chalot, Monarthrite suppurée d'origine rhumatismale. Montpellier méd. Janv. 1876.

befürchten ist das Eintreten unvollkommener, seltener totaler Ankylose. An die Berücksichtigung dieser Eventualitäten reiht sich demnach eine entsprechende Vorsicht bei Stellung der Prognose.

Die pathologisch - anatomischen Erscheinungen bei der Monarthritis rheumatica sind in einem intensiveren Grade gegeben als bei der Polyarthritis. Die das Gelenk umgebenden Weichtheile sind serös infiltrirt, sehr hyperämisch, zuweilen erscheint das Zellgewebe um die Synovialkapsel herum verdickt, selbst phlegmonös. Die Synovialmembran ist geschwellt, stark injicirt, mit zahlreichen Ecchymosen versehen, auf der Innenfläche befinden sich fibrinös-eitrige Auflagerungen, die Innenfläche hat ihren Glanz verloren, ihr Epithel ist getrübt, zum Theil abgestoßen. Der Gelenkinhalt entbehrt des Charakters einer reinen Synovia (Asynovia), ist dünnflüssig, grüngelb, enthält neben Eiterkörperchen Fibrinflocken und zahlreiche Blutkörperchen, in welchem letzterem Falle die Flüssigkeit dunkler gefärbt ist; ihre Menge kann eine ziemlich bedeutende Höhe erreichen. Die vorwiegend eitrige Beschaffenheit derselben bleibt nicht ohne Einfluß auf das Entstehen einer tieferen Entzündung des Knochens, zunächst des Knorpels. Am Letzteren kommt es zu mannigfachen Veränderungen, zu entzündlicher Schwellung, partieller blutiger Imbibition, tiefgreifender Ulceration, schließlic zu wirklicher Zerstörung mit Bloslegung der Knochensubstanz nach Angabe von Chomel,¹⁾ Bouillaud, Morgagni und Latour. Unter letzteren Verhältnissen erscheinen die Knochen-Enden rauh, dunkelroth injicirt.

Glücklicherweise ist ein derartiger Ausgang der Monarthritis rheumatica selten; meist kommt es hier zu einem lang bestehenden Exsudat, welches zum Theil sich organisirt und durch Verdickung der Kapsel und Bänder zu partieller Ankylose führt.

¹⁾ Chomel, Leçons de clinique médical.

Therapie.

Bei Berücksichtigung der vorstehend erörterten Verhältnisse muß man zur Ansicht gelangen, daß es sich bei der monoartikulären Form des akuten Gelenkrheumatismus um eine schwere, hartnäckige, oft von üblen Folgen begleitete Erkrankung handelt, der gegenüber energische therapeutische Maßnahmen am Platze sind; gerade die Lokalisation des Prozesses gibt uns ein Mittel an die Hand, das nicht ohne Erfolg ist, und dieses Mittel besteht in einem ausgiebigen antiphlogistischen Verfahren.

Hinsichtlich der Behandlungsmethoden nun besteht eine scharfe Grenze zwischen der polyartikulären und der monoartikulären Form; ist ein Unterschied zwischen Beiden in Bezug auf die Aetiologie nicht gegeben, so macht sich bezüglich der Symptomatologie und Pathologie eine fortschreitend abweichende Richtung geltend bis zur vollkommenen Divergenz in puncto therapiae. Die unzähligen Heilmittel, welche bei der Polyarthritis je in Vorschlag gebracht und in Anwendung gezogen wurden, erweisen sich der Monarthritis gegenüber vollkommen machtlos; hieher zählt vor Allem der Gebrauch der Salicylsäure oder ihrer Präparate, deren Erfolg bei der Polyarthritis in den meisten Fällen nicht zu verkennen ist. Wittich¹⁾ erwähnt, daß unter 52 Fällen von Rheumatismus acutus 51 Fälle durch Salicylnatron geheilt wurden, während einer dieser Behandlung hartnäckig widerstand; dieser einzige Mißerfolg in der Salicylbehandlung betrifft einen Rheumatismus acutus, welcher monoartikulär geworden war und, nachdem er zuerst an 4 Gelenken zum Vorschein gekommen, sich im Handgelenke lokalisiert hatte. Die Behandlung der Monarthritis rheumatica beschränkt sich demnach bei dem Mangel eines spezifischen Mittels auf eine streng durchgeführte Antiphlogose, vornehmlich örtliche Blutentziehungen in Form von Blutegeln oder

¹⁾ Medizin. Studien über die Salicylpräparate, herausgegeben von Heyden.

Schröpfköpfen, mit gehöriger Berücksichtigung der individuellen Constitution. Nach Chomel erweisen sich Blutegel und Schröpfköpfe bei exzessiven und hartnäckig auf ein Gelenk fixirten Schmerzen sehr nützlich.

Seymour¹⁾ hält bei lokalisirtem Gelenkrheumatismus für das Beste die örtlichen Blutentziehungen, desgleichen Bouillaud²⁾ und Levy. Law³⁾ geht nach Besprechung der Therapie des akuten Gelenkrheumatismus überhaupt auf die der lokalen Affektion ein und empfiehlt hier Blutegel.

Guéneau de Mussy räth zur antiphlogistischen Methode bei bestimmter Lokalisation ohne Variabilität.

Blank⁴⁾ glaubt in einem sehr schweren Falle nur durch wiederholte reichliche Blutentziehungen Heilung erzielt zu haben.

Canstatt's Jahresbericht⁵⁾ enthält eine Notiz zur Therapie des monoartikulären Gelenkrheumatismus, nemlich Ansetzen von Blutegeln mit nachfolgender Compression des Gelenkes durch Collodium elasticum, wonach die Schmerzen sofort sistiren und die Geschwulst in kurzer Zeit verschwindet; diese Methode hat Prévault⁶⁾ 3 mal an sich selbst erprobt. Zur Behandlung mit Kälte hat Scoda⁷⁾ den ersten Anstoß gegeben; sobald die Geschwulst an einem Gelenk beträchtlich wird und der entzündliche Prozeß nicht ein flüchtiger ist, sondern auf ein Gelenk lokalisirt bleibt, muß man kalte Umschläge machen und es von der Empfindung des Kranken abhängen lassen, ob man intensive oder weniger intensive Kälte anwenden, oder

¹⁾ Edward J. Seymour: über die wirksamste Behandlung des ak. Gelenkrheumatismus im Hospitale St. George 1830—1838.

²⁾ Traité clinique du rhumatisme articulaire. Paris 1840.

³⁾ Rol. Law: über die Therapie des akuten Gelenkrheumatismus.

⁴⁾ Blank: Observation d'un rhumatisme compliqué; Journal des conaifs. méd. et chir. 9.

⁵⁾ Canstatt's Jahresbericht der gesammten Medizin. 1862. II.

⁶⁾ Gazette des Hôp. Nr. 12.

⁷⁾ Wiener med. Presse.

den betreffenden Theil nur kühl halten soll. Esmarch hat in neuester Zeit eine consequente Eisapplikation empfohlen.

Lebert's Behandlungsmodus gestaltet sich folgendermaßen. Im Beginn und bei kraftigen Subjekten ist energische und wiederholte örtliche Antiphlogose, wenn auch nicht immer unmittelbar, doch insofern nützlich, als die Schmerzen gemindert werden, und der Gesamtverlauf sich günstiger zeigt; Ruhe und passende Lagerung des betreffenden Theiles sind hier von ganz besonderer Wichtigkeit. Nach 1—2 Tagen sind dadurch die Schmerzen sehr gemindert, die Geschwulst verschwindet allmählig. In sehr hartnäckigen Fällen kommt man mit Vesikantien, transkurrente Glühhitze, Caustika und Moxen zum gewünschten Ziele. Warme Bäder von längerer Dauer, warme Douchen, oder lokale Bäder mit einer Lösung von Kali sulphuratum oder Sublimat, sind besonders gegen zurückbleibende Gelenksteifigkeit zu empfehlen. Innerlich rath Lebert den Gebrauch von Jodkali oder in besonders schweren Fällen von Tartarus stibiatus in hohen Dosen.

Hinsichtlich der Lagerung des affizirten Gelenkes macht Bonnet¹⁾ darauf aufmerksam, daß man eine halbe Flexionsstellung, wie sie die Kranken immer anzunehmen pflegen, durchaus nicht dulden soll, da hierbei für's Erste eine Ankylose in einer fatalen Stellung zu Stande kommen kann, für's Zweite die Erzeugung einer spontanen Luxation begünstigt wird.

Betreffs der Art und Weise des Ansetzens der Blutegel gilt als richtig, daß die Applikation derselben unterhalb des erkrankten Gelenkes nicht nur keinen Nutzen, vielmehr Schaden bringt, indem die Blutkongestion zum Gelenk dadurch gesteigert wird. Man setzt sie für gewöhnlich auf, oder wie namentlich Bonnet empfiehlt, über das Gelenk, z. B. bei Affektion des Fußgelenks auf den mittleren oder unteren Theil des Unterschenkels, nehmen sodann die entzündlichen Erscheinungen

¹⁾ Bonnet, Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Gelenkkrankheiten.

immer mehr ab, so kann man successive dem Gelenke näher rücken.

Was die Zahl der Blutegel anlangt, kommen zunächst die Kräfte des Kranken und die Heftigkeit der Entzündung in Betracht; für gewöhnlich ist eine große Anzahl erforderlich, 20—30 Stück, nach Bardleben bis zu 50. Beim Ansetzen verfährt Lebert auf folgende Weise; er applicirt zumeist oberhalb des Gelenkes, wo schon beim ersten Anblick die Venen am bedeutendsten geschwellt erscheinen und die Capillaren sehr turgesziren 2 bis 3 Blutegel und ersetzt diese, sobald sie abgefallen sind, durch neue, bis auf diese Art 15 bis 20 Stück zur Anwendung gekommen sind.

Der Gebrauch von Schröpfköpfen ist weniger zulässig; höchstens an Gelenken, die eine größere Fläche darbieten, wie das Schulter- und Hüftgelenk; gleichwohl leisten sie weniger als die Blutegel, indem sie auf einem so engen Raume nicht eine entsprechende Menge Blut entziehen können; einige Schriftsteller, z. B. Bell und Bouillaud, halten sie für wirksamer als die Blutegel.

Eine für die spätere Funktionsfähigkeit der Glieder sehr wichtige Nachbehandlung besteht in einer ergiebigen Massage und der Darreichung warmer Bäder.

Starke¹⁾ macht darauf aufmerksam, daß ihm mehrmals Fälle vorgekommen, bei denen nach rheumatischen Gelenkentzündungen so hochgradige Beeinträchtigungen der Funktion der erkrankten Glieder eingetreten waren, daß von einer Gebrauchsfähigkeit derselben kaum die Rede war und die Wiederherstellung nur in sehr beschränkter Weise erreicht werden konnte; er empfiehlt die rationelle Anwendung der Massage.

Ihre Wirkung ist durch ein die physiologische Lymphbewegung nachahmendes, resp. ersetzendes Moment erklärt. Das Hauptagens bei der Lymphbewegung ist neben der Re-

(¹ Starke, *charité-Annales* III.

spiration die Muskelbewegung; eine gleiche Wirkung auf die Bewegung der Lymphe hat die Manipulation des Streichens (effleurage) in centripetaler Richtung; diesem Streichen geht ein ergiebiges Drücken (massage en friction) und Kneten (petrissage) voraus, um die in das Zellgewebe infiltrirten Exsudatmassen zu lockern und zu verkleinern, und für den Eintritt in die offenen Lymphbahnen geeignet zu machen; ferner hat man auf eine hohe Lagerung des Gliedes zu sehen, um durch Gravitation auch einen steten Abfluss zu ermöglichen.

Der Modus der Behandlung, wie er auf der I. med. Abtheilung von Herrn Geheimrath von Gietl eingehalten wird, berücksichtigt die strengste Antiphlogose. Obenan stehen lokale Blutentziehungen in Form von Schröpfköpfen oder Blutegel; erstere an den dazu geeigneten Gelenken, letztere anfänglich täglich zu 4 bis 6 Stück, später alle 2 Tage, so lange die Geschwulst noch beträchtlich ist; der Schmerz ist zumeist schon in den ersten Tagen verschwunden. Die antiphlogistische Wirkung der Blutentziehungen wird unterstützt durch eine intercurrente Anwendung von Eis; dabei wird auf eine constante Hochlagerung des betreffenden Gliedes mit absoluter Ruhe gesehen. Innerlich verabreicht von Gietl bei einem sehr akuten Zustande Tartarus stibiatus mit Ipecacuanha, dessen Erfolg oft ein überraschend günstiger ist.

Rp. Tart. stibiat. 0,01

Pulv. rad. Ipecac, 0,5.

Mfp. D. F. D. Nr. III. Alle 2 Minut. 1 Pulver.

Als Nachbehandlung wird täglich zweimal die Massage ausgeführt; außerdem wechselt mit Prießnitz'schen Einwicklungen die Darreichung warmer Bäder (28° R.)

Es möge mir an dieser Stelle gestattet sein, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Geheimrath Professor Dr. Ritter von Gietl, einerseits für die gütige Ueberlassung dieser Arbeit, andererseits für die geneigte Gefinnung, deren ich mich stets zu erfreuen hatte, meinen innigsten Dank auszusprechen.

Krankheits-Geschichten.

I. Fall. H. B., 21 J. a., Dienstmagd, kam am 26. Nov. 1880 in das Spital mit der Klage über heftige Schmerzen in beiden Ellenbogengelenken und im rechten Schultergelenke. Früher immer gesund und bei Anwesenheit von hereditärer Anlage schiebt sie die Schuld der gegenwärtigen Krankheit auf den Umstand, daß sie als Magd seit 2 Tagen auf Steinpflaster zu stehen hatte; die übrigen Verhältnisse der Patientin Wohnung, Kost ließen Nichts zu wünschen übrig, Menfes und Stuhl waren in Ordnung, Appetit fehlte.

Status praesens: afebrilis, Herztöne sehr accentuirt, an der Mitrals ein leichtes systolisches Blasen hörbar; äußerlich geben die erkrankten Gelenke keine Veränderung zu erkennen, bei Bewegungsversuchen wird der Schmerz unerträglich.

Therapie: Natr. salicylic. 6,0. Watteinwicklungen.

27. Nov. Mtp. 38,0, Atp. 38,2. Transpiration der Haut sehr bedeutend; Schmerzen sind weniger, Bewegung jedoch unmöglich; Behandlung wie am vorhergehenden Tag.

28. Nov. Mtp. 37,3, Atp. 38,6. Rechtes Schulter- und Ellenbogen-Gelenk sind frei, linkes Ellenbogengelenk noch affiziert.

30. Nov. Mtp. 38,0, Atp. 39,4. Schmerzen nur im linken Handgelenk, Drücken auf der Brust, Herzpalpitationen.

Therapie: Natr. salicylic. 6,0. Watteinwicklung, Sinapismen und Eisblase auf die Herzgegend.

2. Dezember. Mtp. 38,0, Atp. 39,2. Die früher befallenen Gelenke sind frei, der ganze Prozeß hat sich auf das linke Handgelenk lokalisiert und bietet das reine Bild eines Monoartikular-Rheumatismus.

Therapie: Hirudines Nr. VI. ad. artic. manus.

3. Dez. Mtp. 37,3, Atp. 39,0. Schmerzen dauern an; bedeutendes Oedem des Handrückens. Ordinat. Eisblase.

5. Dez. Mtp. 38,5, Atp. 39,3. Verschlimmerung des Allgemeinbefindens.

7. Dez. Mtp. 37,6. Atp. 39,2. Iiektifcher Charakter des Fiebers, Appetit vermindert, deutliche Fluktuation am Corpus, das Gelenkende des Radius springt stark hervor, ist trotz der enormen Geschwulst fast ungreifbar, anscheinend außer Contact mit den entsprechenden Gelenkflächen der Carpalknochen.

Ordinat. Hirudines Nr. VI.

9. Dez. Mtp. 37,1, Atp. 39,3. Schmerzen haben etwas nachgelassen, Bewegung unmöglich. Ordin. Eisblase.

12. Dez. Schwellung sehr stark. Ordinat. Hirudines Nr. IV. Prießnitz.

17. Dez. Mtp. 37,4, Atp. 39,8. Seitens des Herzens keine Erscheinungen, Schmerzhaftigkeit bei Ruhe verschwunden.

22. Dez. Von nun an zeigt die Temperatur eine geringe abendliche Exacerbation. Allgemeinbefinden befriedigend, Schwellung besteht fort. Ordinat. Hirudines Nr. IV.

26. Dez. Eine geringe Abnahme des Gelenkvolumens zu constatiren. Ordinat. Hirudines Nr. III.

30. Dez. Bewegung des Gelenkes noch schmerzhaft. Ordinat. Hirudines Nr. III. Prießnitz.

Von jetzt an schreitet die Besserung schnell vorwärts; die Geschwulst wird kleiner, keine Schmerzen, Oedem des Handrückens verschwindet. Täglich zweimal vollzogene Massage, öftere Darreichung von Handbädern, fortgesetzte Prießnitz-Fomente helfen die bestehende Gelenksteifigkeit bald beseitigen, und es wird Patientin nach zehnwochentlicher Krankheitsdauer geheilt entlassen.

II. Fall. G. A., 20 J. a., Ladnerin, ging am 11. April 1881 im Krankenhause zu; dieselbe gab an, dafs sie einmal die Diphtherie und vor $\frac{1}{2}$ Jahre den Gelenkrheumatismus durchgemacht habe; gegenwärtig verspüre sie wieder Schmerzen in beiden Schultergelenken, linken Ellenbogen- und Handgelenke. Stuhl und Menfes in Ordnung.

Stat. praes. afebril. In Herz und Lungen Nichts abnormes;

an den affizirten Gelenken ist keine Veränderung an Umfang und Farbe wahrzunehmen. Ordin. fom. tepida.

12. April. Mtp. 37,4, Atp. 37,0. Schmerzen haben nicht nachgelassen, Schlaf wenig.

Ordin. Anwendung des constanten elektrischen Stromes, Einreibung mit Spir. Serpyll. und Mixt. ol. bals.

13. April. Mtp. 37,1, Atp. 37,6. Hauptaffektion an der linken Schulter; die übrigen Gelenke sind frei.

Ordin. Cucurbit. cruent. Nr. VIII. ad humerum sinistr. Baln. 28° R.

14. April. Mtp. 36,5, Atp. 37,5. Schmerzen und Schwellung gleich groß. Ordin. Cucurbit. cruent. Nr. VI. ad humer. sin. — faradisat. Massage.

15. April, kein Fieber. Starke Herzpalpitationen; Puls sehr frequent. Ordin. Vesic. glac. ad cor.

17. April. Herzklopfen besteht fort; Töne rein, accentuirt. Schmerzen beim Versuch den linken Arm passiv zu bewegen; derselbe kann nicht abducirt werden. Ordin. Cucurb. cruent. Nr. VI. ad humer. sin.

21. April. Mtp. 37,8, Atp. 38,3. Schmerzen haben nachgelassen; Schwellung und Bewegungsbeschränkung der linken Schulter gleich. Ordin. Cucurb. cruent. Nr. IV. ad hum. sin. — Baln. 28° R.

Inf. Senn. frig. par.

24. Beweglichkeit besser, Herzklopfen verschwunden.

Ordin. Massage — fom. h. t.

26. April. Mtp. 38,1, Atp. 39,0. Patientin hat mehr diffuse, aber keine lokalisirten Schmerzen mehr; eine passive Erhebung des linken Armes in die horizontale Richtung ist möglich. Herztöne rein, Aktion irregulär. Ord. Baln. 28° R. Massage. — Sinapism. ad. cor.

29. April. Abends geringe Temperatursteigerung mit Kopfweh. Ordin. Tägliche Massage mit warmen Bädern. Bei dieser Behandlung schreitet die Heilung rasch vorwärts, so daß

Patientin am 7. Mai bei voller Gebrauchsfähigkeit ihres linken Armes das Spital verläßt.

III. Fall. H. J., Magd, 20 J. a., wurde am 14. März 1881 in des Spital aufgenommen. Anamneltisch ergab sich, dafs Patientin mit Ausnahme einer Gebärmutterentzündung noch keine Krankheit durchgemacht hatte. Seit einigen Tagen bestehen Schmerzen in beiden Knie- und Ellenbogen-Gelenken. Appetit gering, Stuhl und Menfes regelmäfsig.

Status praesens afebrilis. Am Herzen ist eine starke Aktion zu eruiien; Lungen sind frei; die affizierten Gelenke sind bewegungsunfähig. Ordin. Natr. salicyl. 1,0 dos. VI. Watteinwicklungen.

16. März. Mtp. 37,5, Atp. 38,5; Schmerzen dauern an. Ordinat. eadem.

20. März. Die Fieberbewegung zeigt eine konstante abendliche Elevation bis zu 38,8. Die früher befallenen Gelenke sind frei, dagegen Schmerzen im rechten Handgelenk.

Ordin. Natr. salic. 1,0 dos. VI. Wattfomente.

23. März. Das Natr. salic. erweist sich völlig wirkungslos; der ganze Prozeß hat sich auf das rechte Antibrachio-carpal-Gelenk lokalisiert; Schwellung enorm.

Ordinat. Hirudines Nr. VI. ad artikul. man. dextr.

25. März. Schmerzen weniger, werden bei Bewegungsversuchen gesteigert.

Ordin. Hirud. Nr. VI. postea Vesic. glac. Hohe Lage.

28. März. Schwellung besteht fort; über das Niveau derselben erhebt sich das capitulum ulnae, scheinbar aufer Berührung mit den entsprechenden Gelenkflächen der Handwurzelknochen. Ordin. Hirud. Nr. VI.

30. März. Am Herzen sind keinerlei Veränderungen vorhanden; Schwellung scheint abzunehmen. Fluktuation deutlich zu fühlen.

Ordin. Rechter Vorderarm wird auf Spreukissen in abso-
luter Ruhe erhalten; Applikation von Eis.

2. April. Abendliche Fiebersteigerung bis zu $38,5^{\circ}$. Schmerzen verschwunden, Schwellung nimmt sichtlich ab. Vollständige Bewegungs-Unfähigkeit des rechten Handgelenkes, ferner der Metakarpo-Phalangealgelenke.

5. April. Kein Fieber.

Von jetzt an wird Patientin 2 Mal täglich am rechten Handgelenk ergiebig massirt, bekommt häufige Handbäder; das Allgemeinbefinden wird von Tag zu Tag besser. In kurzer Zeit tritt eine Bewegungsfähigkeit der Finger ein, nach energisch fortgesetzter Massage die des ganzen rechten Handgelenkes ein, so daß Patientin Ende Mai als vollkommen geheilt zu betrachten ist.

IV. Fall. R. M., 17 J. a., Magd, trat am 17. Dezember 1880 ins Spital ein; angeblich bekam Patientin vor 3 Wochen Schmerzen in der rechten Schulter (welche jetzt noch bestehen); später traten auch Schmerzen im rechten Ellenbogen- und linken Fußgelenk auf. Früher war Patientin nie krank.

Stat. praes. febrilis $38,0^{\circ}$. Herzaktion sehr erregt, Puls zeigt 108 Schläge in der Minute, mit dem 7. Schläge intermittirend; außer einer Röthung und geringen Anschwellung des linken Fußrückens besteht weiters kein objektiver Befund. Ordin. Natr. salic. 1,0 dos VI. Watteinwicklung der affizierten Gelenke.

20. Dezember. Kein Fieber. Schmerzen hauptsächlich am rechten Ellenbogen. Ordin. eadem.

24. Dezember. Rechtes Schultergelenk affiziert. Ordin. eadem.

28. Dezember. Rechte Schulter schwer beweglich, schmerzhaft. Ordinat. Cucurb. cruent. Nr. VI. ad humer. dextr.

30. Dezember. Stat. idem.

1. Januar. Kein Fieber, Schmerzen bestehen fort, Bewegung unmöglich. Ordinat. Cuc. cruent Nr. VI. ad hum. dextr.

4. Januar. Schmerzen verschwunden. Bewegung besser.
 Ordin. 'Cuc. cruent. Nr. VI. ad hum. dextr.

7. Januar. Der rechte Arm kann in horizontale Richtung gebracht werden.

Durch fortgesetzte Anwendung der Massage und Darreichung von warmen Bädern ist Patientin nach 14 Tage im Stande, ihren Arm willkürlich zu gebrauchen.

V. Fall. G. A., 44 J. a., Magd, wurde am 16. Dezember 1880 ins Spital aufgenommen; sie war früher immer gesund. Vor 8 Tagen erkrankte sie mit Schmerzen in beiden Handgelenken, im linken Knie- und Fußgelenke. Schwellung bestand angeblich nicht.

Stat. praes. afebrilis.

Herz und Lungen frei.

Schwellung, Röthung und Druck-Empfindlichkeit am rechten Fußgelenk.

Ordin. Natr. salic. 1,0 dos VI. Watteinwicklungen.

19. Dezember. Kein Fieber. Schmerzen weniger, Bewegung normal.

20. Dezember. Linkes Kniegelenk befallen; beträchtliche Schwellung desselben, große Schmerzhaftigkeit bei Bewegung.

Ordin. Natr. salic. 1,0 dos VI. fom. t.

22. Dezember. Status idem. Ordin. Hirudines Nr. VI. ad artic. genu sinistr.

23. Dezember. Schwellung des linken Kniegelenkes enorm, Palpation sehr empfindlich.

Ordin. Hirudin. Nr. VI.

25. Dezember. Abendliche Temperatursteigerung 38,2°. Schmerzen unbedeutend, Schwellung dauert an.

27. Dezember. Stat. idem. Ordin. Hirudin. Nr. VI. f. h. t.

29. Dezember. Schwellung geringer. Ordin. fom. h. t.

1. Januar. Fluktuation gering, Bewegung schwer.

Ordin. Hirudin. Nr. IV.

3. Januar. Kein Fieber. Keine Schmerzen; Bewegung möglich. Durch Maffage und warme Bäder wird eine rafche Besserung erzielt und Patientin nach 3 Wochen gefund entlassen.

VI. Fall. H. Th., 21 J. a., Näherin, kam am 11. Sept. 1880 in das Krankenhaus; früher nie krank verfpürt fie feit 3 Tagen heftige Schmerzen in den beiden Schultergelenken und linkem Fußgelenke. Stuhl angehalten, Menfes irregulär.

Stat. praes. febril. 39,4⁰. Herzaktion fehr befchleunigt. Puls 120 Schläge, klein, hart.

Die befallenen Gelenke find ftark gefchwollen, geröthet.

Ordin. Natr. salic. 1,0 dos VI. fom. t.

12. September. Mtp. 39,0, Atp. 39,0. Heftige Schmerzen im rechten Schulter- und Ellenbogengelenke; beide können nicht bewegt werden.

Ordin. Natr. salic. 1,0 dos VI.

13. September. Rechtes Ellenbogengelenk allein befallen.

Ordin. Hirudin. Nr. VI. f. h. t.

14. September. Mtp. 38,9, Atp. 39,0. Schmerzen haben nachgelaffen, Schwellung vorhanden.

Ordin. Priefsnitz.

17. September. Mtp. 38,6, Atp. 39,2. Neuerdings Schmerzhaftigkeit des rechten Ellenbogens.

Ordin. Hirudin. Nr. VI. f. h. t.

19. September. Mtp. 38,0, Atp. 39,8. Erleichterung. Ordin. Maffage, Baln. 28⁰ R.

22. September. Mtp. 38,0, Atp. 39,2. Linkes Tibio-tarsal-Gelenk befallen; Bewegung desfelben behindert.

Ordin. Hirudin. Nr. VI. ad ped. sinistr.

25. September. Mtp. 38,2, Atp. 39,0. Schwellung grofs. Syftol. Geräufch an der Aorta.

Ordin. Sinapism. ad cor.

28. September. Mtp. 38,0, Atp. 38,2. Schmerzen am linken Fußgelenk geringer, Schwellung bedeutend.

Ordinat. Hirud. Nr. VI. Priefsnitz.

2. Oktober. Mtp. 37,8, Atp. 38,0. Rechtes Ellenbogengelenk kann frei bewegt werden.

5. Oktober. Mtp. 37,6, Atp. 38,0. Schwellung am linken Fußgelenke nimmt ab.

Fortgesetzte Massage unter Darreichung von warmen Bädern ermöglichen in kurzer Zeit den vollen Gebrauch der früher befallenen Gelenke.
